

K O M U N I K A T z dnia 01.07.2009 r.

O ZWALCZANIU MĄCZNIAKA RZEKOMEGO NA PLANTACJACH CEBULI

Na plantacjach cebuli stwierdzono pierwsze objawy mączniaka rzekomego, w związku z tym należy przystąpić do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Mączniak rzekomy cebuli jest najgroźniejszą chorobą cebuli. Występuje najczęściej na plantacjach nasiennych, na cebuli uprawianej z dymki z siewu wiosennego i ozimego oraz na cebuli siedmiolatce, zwłaszcza na plantacjach zachwaszczonych. Porażone rośliny mają zahamowany wzrost, liście stopniowo wyginają się ku dołowi. Pod koniec maja, podczas ciepłych i wilgotnych nocy, pojawia się białoszary nalot grzybni. W ciągu 3-4 kolejnych dni naloty grzyba pojawiają się niemal na całej roślinie i wówczas może dojść do całkowitego zamierania roślin. Straty w plonach mogą dochodzić do 70%. Cebule z porażonych plantacji źle się przechowują, przedwcześnie wybijają w szczypior.

UWAGA:

- Do zabiegów zwalczania danego organizmu szkodliwego można stosować tylko środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl >Informacje Branżowe >Produkcja Roślinna >Ochrona Roślin.
- Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
- Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej mogą być wykonywane przez osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Środki ochrony roślin należy stosować tylko sprzętem sprawnym technicznie.
- Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849. z póź. zm.)]

Kierownik Oddziału
Danuta Łukowska

Załącznik do komunikatu W-2 (tylko do użytku służbowego)

Wykaz środków ochrony roślin do zwalczania mączniaka rzekomego na plantacjach cebuli

NAZWA ŚRODKA	DAWKA na 1 ha	KARENCCJA w dniach	NAZWA ŚRODKA	DAWKA na 1 ha	KARENCCJA w dniach
ACROBAT MZ 69 WG	2-2,5 kg	14	INDOFIL 80 WP	2,5 kg	14
ALTIMA 500 SC*	0,5 l	28	MANCONEX 80 WP	2-3 kg	14
AMISTAR 250 SC	0,8 l	14	MILDEX 711,9 WG	2,5 kg	14
BIOSEPT 33 SL	1,5 l	nie dotyczy	POLYRAM 70 WG	2 kg	5
BRAVO 500 SC	2-2,5 l	14	PLANET 72 WP	2,5 kg	14
CURZATE M 72,5 WP	2-2,3 kg	14	RIDOMIL GOLD MZ 68WG	2,5 kg	14
DITHANE Neo Tec 75 WG	2-3 kg	14	TATOO C 750 SC	2,5 l	7
EKONOM MC 72,5 WP	2-2,5 kg	14	TANOS 50 WG (cebula z siewu)	0,5 kg	14
GREVIT 200 SL	1,5 l	nie dotyczy	TOSKA 72,5 WP	2 – 2,5 kg	14
GWARANT 500 SC	2-2,5 l	7	VALBON 72 WG	1,75-2,0 kg	14

* nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy

- plantacje z siewu opryskiwać dopiero od III dekady lipca,
- usuwać chore rośliny z objawami pierwotnej infekcji,
- utrzymywać plantacje wolne od zachwaszczenia.